
DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

DYSPEPSIA.

DISSERTATIO MEDICA
IN AUGURALIS

DE

DYSPEPSIA

QUAM

ANNUENTE SUMMO NUMINE

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri

D. GEORGII BAIRD, S. T. P.

ACADEMIE EDINBURGENSIS PRÆSIDENTIS

VERBO

Amplissimi SENATUS ACADEMICI CONSENSU

Et nobilissime FACULTATIS MEDICÆ DECRETIS

PRO GRADU DOCTORIS

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENTIBUS

Examinatum examini subijctum

HUGO MACPHERSON, A. M.

SCOTO-BRITANNUS

Soc. Med. Edin.

ACNON

Soc. Nat. Studior.

KUPER

Præses Annuus

Ad diem 11 Septembris, hora locoque solitis

EDINBURGI

Apud BALEFORD & SMELLIE

Academice Typographos

M. DC. XCIV.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE

DYSPEPSIA;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

HUGO MACPHERSON, A. M.

SCOTO-BRITANNUS,

Soc. Med. Edin.

NEC NON

Soc. Nat. Studios.

NUPER

Praefes Annuus.

Ad diem 12. Septembris, hora locoque solitis;

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,
Academiae Typographos.

M, DCC, XCIV.

Viro integerrimo

JOANNI MACPHERSON,

EQUITI BARONETTO,

&c. &c.

Hoc opusculum,

Grati animi

Quam leve monumentum !

Sacrum esse

Voluit

Devotissimus

A U C T O R.

MASTERS OF THE ARTS

JOHN W. WATSON

PROFESSOR OF

PHILOSOPHY

DEPARTMENT OF

PHILOSOPHY

UNIVERSITY OF

CHICAGO

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

DYSPEPSIA.

Auct. HUGONE MACPHERSON.

FACIEM adeo variam et incertam prae se fert dyspepsia, ut vix in definitionis formam signa ejus omnia redigi possint. Cullenus noster, Nosologorum facile princeps, symptomata ejus praecipua et stabiliora verbis sequentibus protulit: “ Anorexia, nausea, vomitus, in-

“ flatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodyn-

“ nia, pauciora saltem vel plura horum simul

A

“ concur-

“ concurrentia, plerumque cum alvo adstricta,
 “ et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum
 “ partium, morbo.”

Est quidem dyspepsia morbus omni regioni, sexui, ac aetati communis. Primo stadio, adest solummodo sensus quidam ponderis et oppressionis circa ventriculi regionem, fugax initio, sed frequens: Post pastum apprime molestus, nec ulli causae speciali tribuendus. Haud longo autem intervallo, sequuntur signa graviora. Urgent fordes acidae in ventriculo cum flatu. Est alvus adstricta, nec valet, ut antea, exercitatio paululum aucta haec tollere mala; per hebdomadam nunc vel etiam per menses perstant; et dolor ventriculi primo obscurus, nunc vehementior, et cum torminibus intestinorum, quotidie vexat.

Valetudinem adversam animadvertere incipiente aegro, nunc ingravescunt omnia signa. Appetitus plerumque languescit. Pastum semper insequitur

insequitur nausea, nec raro alimenta cruda indigestaque protinus vomitu rejiciuntur. Haec comitantur ructus varii saporis. Alvi astrictio fere perpetua, ni forte diarrhoea, cum ventriculi et intestinorum dolore rodente, adfit.

Miserum fugit nunc somnus quoque. Dolori capitis, anxietati, et vertigini additur saepe tussis, fitis, praecipue mane, et spirandi difficultas. Sensus visus ac auditus nonnunquam depravantur; est etiam suffusio et dolor quasi internus oculorum, urgetque tinnitus aurium. Corpori ita laboranti accedit plerumque mentis affectio et nova series malorum. Est aegri animus dimissus, causis haud aequis facile perturbatus. A labore corporeo jam aversus, fugit nunc aequae mentis exercitationem, et qui olim intrepidus periculum timore plusquam muliebri fugit. Vix aut ne vix quidem mentis est longius compos. Evanescent quotidie animi vis et robur, et facultates, quae hominem maxime distinguunt animalibus.

malibus. Est etiam habitus totus relaxatus, cutis, facies, lurida, totum corpus emaciatum. Simul forsan invadit febris hectica, vel anasarca debilitate gaudentes, et, haud longius valente medicina, descendit lente sed certis passibus ad tumulum aeger.

Talis est dyspepsiae regularis historia. Dyspepsiae, scilicet diu et gradatim crescentis, et quasi maturescentis, lethalis tandem evasurae. Horrenda quidam sed rara omnino, et humano cum genere bene agitur, quod morbi tam frequentis raro occurrant exemplaria tam gravia. Concurrentibus paucis ex signis supra relatis praesentem agnoscimus morbum. Inde mirum in modum variat dyspepsiae facies, prout horum quidvis prae caeteris valere datur. Cibi appetitus aliquando auctus vel immutatus est; atque ingestorum concoctio cum corporis nutritione, si modo ex aegroti pinguedine conjicere liceat, vix aliter ac integra valetudine peragitur.

tur. Ita ut sensus ingratus ventriculi magis ex nimia alimentorum quantitate, quam ex vi concoctionis diminuta, oriri videatur.

Signa autem dyspepsiae diuturnae maxime characteristica sunt illae mentis affectiones quae timore vano, ut et vanis imaginationibus, indicantur, praesertim quandocunque de morbo, sive morbi curatione, hallucinatur aegrotus. Sunt enim qui, sana mente frui soliti, dyspepsia correpti sese sub inflammatione phlegmonica gravissime laborare crediderunt, atque cuti integrae nec quidem dolenti cataplasmata emollientia indies sedulo adhiberi curaverunt. Foeminae, quoque durae experientiae immemores, solito gestationis tempore jam duplicato, solamen ex longis sed infoecundis laboribus ex partu speraverunt.

DIAG.

D I A G N O S I S.

Tam difficile est diagnofin inter hunc morbum et hypochondriafin reddere, ut non poffimus quin dubitemus gravius ne ejuſdem morbi ſtadium an morbus fit diverſus. Certe haud infrequenter iifdem oriuntur cauſis, et iifdem fere cedunt curationibus. Ventriculi affectiones nunquam non animum afficiunt, et, vice verſa, illius organi funktiones omni mentis perturbatione affici videntur.

Inter ſigna diuturnae dyſpepsiae, illae animi affectiones ſunt quae vano timore, et doloribus indicantur imaginariis, et, ut nobis videtur, quo animus imprefſionibus durabilibus proclivior, eo citius ſupervenit ſtadium illud. Inde temperamentum ſanguineum, animo alacri magis affine,
minus

DE DYSPEPSIA.

minus frequenter quam temperamentum melancholicum appellatum, in hunc gradum dyspepsiae cadit.

Sed, si Cullenum illustriss. sequimur, et hypochondriasin ut morbum a dyspepsia valde diversum tractamus; videtur certe adesse dyspepsia, ubicunque animi dejectio et obscuritas, ventriculi malis possint tribui, et quasi symptomatice sint. Contra vero, ubi sequitur animi pathemata, ventriculi dolor, et dyspepsia, quasi symptomatice est, putatur hypochondriasin adesse.

Difficillimum certe nonnunquam est dyspepsiam symptomatice ab idiopathica distinguere. Arthriticis et dyspepticis eadem est ventriculi affectio. Tam affinis ergo dyspepsiae est podagra atonica, ut in diagnosi formanda historiae causarum praedisponentium et malorum quibus olim laboravit aeger, plusquam morbi faciei, fidentum est. Observandum est tamen, quod
nostro

nostro tempore rarissime invadit podagra foeminas, vel imberbes, dum, provecta aetate, Epicuri discipulos, quibus cutis aspera et temperamentum phlegmaticum, aggredi gaudet. Sequitur quoque saepissime labem haereditariam podagra.

Dyspepsia contra, ut supra diximus, omni aetate aequae inimica, nec tenerae puellae, nec robusto juveni, nec etiam senectuti ipsi, parcat.

Est alter cui dyspepsia saepe adjungitur morbus, hysteria. Sensus vero globi, et musculorum oesophagi affectio, totius corporis convulsiones, universi systematis mobilitas, ex statu systematis genitalis pendens, vix errare sinant.

CAUSÆ REMOTÆ.

Temperamenta, sanguinea et melancholica appellata, magis sine dubio actioni causarum occasionalium

causalium praedisponentia saepissime et gravissime aggreditur dyspepsia. Sunt causae remotae quaecunque ventriculum, vel nimio stimulo, vel defectu soliti stimuli, debilitant. Cullen. illustr. dividit in causas quae ventriculum, aut immediate, aut per corpus univrsum, vel alias afficiunt partes.

Sub primo capite posita sunt,

Thea,

Caffea,

Nicotiana,

Liquores spirituosi,

Opium,

Amara,

Aromata,

Putrida,

Liquores callidi,

Nimia Venus,

Frequens vomitus,

Salivae rejectio.

Sub secundo,

Vita sedentaria,

Animi pathemata,

Mentis applicatio,

Ebrietas frequens,

Temperies aëris frigida humiditate
conjuncta. Sed quomodo harum singulae agant,
quo ambitu dyspepsiam inducant varia ingesta,
et multo magis, quo, animi ex pathematibus,
tam subitas et revera praeternaturales mutatio-
nes subeat ventriculus, oportet confiteri haud
nobis explicare datum esse.

CAUSA PROXIMA.

Plane demonstraverunt Spallanzani et Stevens
experimenta, esse fluidum, in ventriculo humano
secretum, quo omnia ingesta, antequam in duo-
denum transeant, et chylum forment, in chy-
mum convertantur. Adjuvant manducatio et
saliva

saliva hunc processum, qui a vi vitali non pendet, quoniam fit extra ventriculum. Docet celeb. Doctor G. Fordyce, esse succo gastrico potestatem ingesta coagulandi, ut vidimus nonnunquam lac et serum coagulari, posteaque certa actione inexplicabili ventriculi concoctionem perfici.

Sed hanc praetermittere theoriam, est nemo qui dubitet, succum gastricum concoctioni perneccessarium esse. Ut vidimus supra, omnes causae dyspepsiae remotae ventriculi totiusque corporis debilitatem inducunt. Licet igitur concludere, his agentibus, succum gastricum mutationes quoad quantitatem et qualitatem subire. Nec, ut profert recens auctor *, “ magis videtur
“ secundum notitiam nostram oeconomiae ani-
“ malis credere ventriculi debilitatem quantita-
“ tem succi gastrici potius quam qualitatem
“ ejus mutare.” Nam, si analogice liceat ratio-
cinari,

* Vide ingenios. A. P. Wilson, M. D. Dissert. Inaugur. de Dyspepsia, pag. 10.

cinari, et haud aliter de his arguere possumus, videbimus omnes fere alias secretiones mutationibus tam qualitate quam quantitate aequè obnoxias esse.

Lachrymae humanae, plerumque blandae et innocuae, nonnunquam tam acridae fluunt, ut cuius ductus excoriant.

Mucus nasalis, qui fluidum est mere lubricans, sub frigoris actione rarus, et etiam acer evenit. Mammae lactis, et jecus fellis, naturam quotidie mutant. Urina nunc limpida, nunc opaca, fluit, subitque omnem varietatem quoad quantitatem; nec magis consentaneae sunt illae varietates, quas omnia fere organa fecerentia inflammatione, et venenorum specificorum effectu laborantia, subeunt.

Surgit omnis secretio ex certa structura et actione vasorum. Si harum alterutra quovis modo

modo mutatur, sequitur, ut causam effectus secretionis mutatio. Vix autem intelligere possumus ullius organi, et praecipue ventriculi, receptaculi communis sed sensilis omnium quibus nunc fruimur ingestorum, conditionem quasi immutabilem.

Nobis etiam videtur perfectae concoctioni pernecessarium esse, statum quem tonicum liceat nuncupare, fibrarum muscularium ventriculi. Huic, ut aliis corporis humani musculis est, sine dubio, data facultas sese conditioni suae adaptandi. Sed, si ultra modum distensus, aut aliter debilitatus sit, in duodenum, ut in chylum vertantur ingesta propellere nequit, quae nimis diu in ventriculo stagnantia chemice resolvi possunt, aliter ac oportet, atque ita ad chylum efficiendum minus apta reddantur.

Processus fermentationis acetosae, vinosae, aut putridae, certe concoctioni inimicissimus est; ideoque,

oque, valente ventriculo et succo gastrico, semper reprimitur. Occurrente autem remora in ventriculo, five ex schirrositate aliave pylori obstructione, five totius organi atonia, gignitur fermentatio; nec sufficit succus gastricus suppressere.

Nobis igitur videtur, dyspepsiae proxima causa esse, vel diminuta praeternaturaliter succi gastrici secretio, vel hujus liquoris conditio, quoad qualitates vitiosa, ex atonia vasorum fecernentium, itidemque fibrarum muscularium debilitate, pendentis.

PROGNOSIS.

Facilis et plerumque faustus est in dyspepsia prognosis, si modo veteres consuetudines Æsculapio aegri immolant. Hoc dato, etiam senibus, quibus adsunt habitus firmus et stamina quasi vitae,

vitae, est nihil a morbo recente timendum. Juventuti et sanguineo temperamento gestatione et exercitio plusquam medicina opus erit.

Contra vero, si Bacchi diu clienti, vel studiis pervigiliisque exhausto, denique, si debilitati supervenerit dyspepsia, gravius longe malum cautiorque quoad tempus prognosis. Tales gaudet aggredi dyspepsia, nec brevi demissurus est morbus, praesertim si adsit aegro temperamentum melancholicum, superstitiosum, et haud recentissimus morbus.

Praegrande vero periculum, et infaustissima prognosis, quum cibi appetentia diu perdita, pallefcit aeger, vanescunt quotidie solida, et perpetuis agitated timoribus deficit et corporis robur et animi vis. Si autem supradictis supervenient anasarca, aliave aquae depositio praeternaturalis, pylori schirrositas, tactu vel pressione dignoscenda, vel, quod occurrere vidimus, febris hectica,

hæctica, falli non possumus, actum est de aegro.

RATIO SYMPTOMATUM.

Nunc de symptomatibus in hoc morbo maxime pathognomonicis, pauca dicenda, et imprimis

Anorexia.—Quum cibi appetentia maxime ex fucci gastrici in ventriculum actione oriri videtur, nemo est qui possit dubitare anorexiam ex hujus liquoris defectu, vel depravatione, ortum nonnunquam ducere. Inde inter constantiora dyspepsiae signa est anorexia, quamvis nonnullis exemplis est appetentia praeternaturaliter aucta. Nemo est qui nesciat ex fordibus in ventriculo anorexiam etiam oriri; et ex juvantibus apparet, aliquid atoniae qua fibrae motrices ventriculi afficiuntur tribuendum. Omnibus enim cognitum, quantum anorexia laborantes salitis et aliis gaudeant stimulantibus. Haec, si praebentur,

beantur, ut alii cibis vescuntur, sed vix appetitum post aliquot dies sentiunt, si negentur.

Nausea et *vomitus* gradu solummodo inter se differunt, et ex fibrarum muscularium ventriculi antiperistaltico motu originem ducunt. Difficillimum et forte inutilissimum foret hujus varietatis causas sub certa capita comprehendere. Provocatur variis ingestis etiam blandissimis, nec ulli normae potest horum actio tribui.

Inflatio est nunc consideranda. Fermentationi tam amica sunt ventriculi humani calor, humiditas, et ingestorum varietas, ut multi putent hujuscemodi aliquid antequam cibis quibus vescimur in chymum, et denique chylum reddantur, semper accidere.

Ex cel. Pringle et Macbride experimentis apparet, saliva tam copiose cum ingestis in ventriculum antequam descendat mixta, maxime

adjuvari. Monstravimus supra, esse succum sano ventriculo secretum, eidem processui inimicum; existente autem dyspepsia, cum ventriculi major solito debilitas adest contentorum remora. Est etiam succi gastrici defectus vel depravatio. Oritur ergo nunc facile fermentatio, ubi vix et ne vix quidem ulla oriri debuit. Sequitur aëris extricatio, et inde de qua nunc tractamus inflatio.

Eructatio originem ducere videtur ex ventriculi quadam motione irregulari, ex aëris extricatione et forsan ab aëris irritatione pendente.

Ruminatio.—Partes alimentorum solidiores, aëris extricati immixtione inter fermentationem, leviores redditae, ad ventriculi orificium surgunt, ibique irritationem efficiunt motionemque inversam inducunt. Inter aërem rejiciendi conatus, massae cibi per oesophagum in os redduntur, iterum ventriculo restituendae.

Gastrodynia.—Videtur hoc symptomata plerumque spasmu fibrarum muscularium gigni, et proverbialiter gignit atonia spasmum. In hoc morbo, praeter spasmum, gignit atonia remoram, acrimoniam ingestorum, indeque distensionem et flatum; ita ut gastrodynia, spasmi ex mera atonia plerumque proles, ab irritatione quoque ducat originem.

Alvus astricta.—Sequitur, necessarie, omnem ingestorum in ventriculo remoram, tarda intestinorum evacuatio. Talis etiam est inter ventriculum et canalem intestinum sympathia; ut hujus atonia illa plerumque afficiatur. In dyspepsia ergo dejectionum alvi retardatio, partim ex ventriculi in hoc morbo conditione, partim ex fibrarum muscularium intestinorum diminuta actione, oritur. Sed, si forte motio peristaltica deest, et, quod temperamento melancholico haud infrequenter accidit, est torpor intestinorum, vix non sequi potest tarda faecum evacuatio.

Cardialgia—Lingua vernacula *heartburn*, sensationem quasi acrimoniae in cardiam apprime molestantem apte exprimens, ex atonia ventriculi, qua in gradum fermentationis solito majorem ingesta progrediuntur, oriri videtur. Originem quoque forsan ducit nonnunquam ab aucta cardiacae sensibilitate, ita ut quae, aut non aut vix acidae sunt, sensationem molestantem et quasi acrem prebeant.

Cephalalgia et *vertigo*, quoniam iisdem cedunt juvantibus, iisdem tribuendae sunt causis. Inter cerebri et ventriculi functiones est certe quaedam connexio vi nervosa innixa. Inde nausea vel vomitus injurias capitis, itidemque ventriculi ictum sequitur vertigo, saepe mors. Sed leges quibus regitur haec sympathia, unde symptomata de quibus nunc tractamus oriantur, plane ignoramus.

Dolor lateris.—Inter alia est hoc symptoma
plerumque

plerumque aegro valde amplificatum. Spasmodicum esse videtur, aut forsan ex irritatione nonnunquam oritur.

Dyspnoea potest ab ventriculi inflatione et distensione, exindeque hujus organi in diaphragma pressione, derivari.

Universa debilitas.—In dyspepsia est generalis nutrimenti defectus, quia in hoc morbo concoctionis functionem per se perficere nequit ventriculus. Unde deest chylus, et a fortiore sanguis corpori. Unde muscoli flaccidi, systematis vascularis relaxatio et diminuta actio, faciei pallor, et forsan etiam oedema.

Animi dejectio — Nusquam est animi et corporis sympathia, et quasi vis reciproca, tam conspicua quam in dyspepsia. Sentit quisque sanus etiam mutationes, gradu quidem differentes, sed ex iisdem pendentes causis; cuiquam corpus ala-

cre est? Adest etiam mens hilaris; spirat Eurus?
 Tristis fit. Bibit vinum? Fugit moestitia.
 Adhibetur digitalis? Iterum est animus dimif-
 fus. Sed hos ultra effectus indagare haud no-
 bis datum.

RATIO MEDENDI.

Ex ante dictis clare credo positum ventriculi
 debilitate oriri dyspepsiam; ideoque, in morbo
 profligando, est haec atonia maxime animad-
 vertenda.

Sequentia medendi consilia Cull. proposuit.

1. **Causas remotas evitare.**

2. **Signa quibus maxime augetur morbus laevare
 aut amovere.**

Ventriculi

Ventriculi tonum restituere. Quoniam, causis remotis agentibus, minime valet in dyspepsia medicina, maximi est momenti quamprimum causas remotas evitare. Nonnullis dyspepticis saepe est ex labe haereditaria ventriculi tanta debilitas ut morbum vix evitare possint. Sed plerisque longe aliter accidit, et oriuntur ventriculi affectiones ex repletionem nimiam ingestorum et nimis frequenter repetita, aut, quod forsan saepius occurrit, ex neglecta exercitatione. Primo morbi stadio ergo, antequam diu praevaluit atonia, si ab his caveatur, rarissime durat dyspepsia.

Quod ad secundum medendi consilium spectat, nempe, quae morbum augescunt ut mitigentur, praecipua sunt, vomitus, aciditas, gastrodynia, et alvi constipatio. Nonnullum esse dyspepsiae signum aegro et medico, vomitu molestius, facile intelligendum est; quoniam ipse

maximas

maximas atoniae et debilitatis causas complectitur. Si tamen ex acribus et diu in ventriculo retentis ingestis provenire suspicamur, est forsitan vomitorium lene, ut pulv. ipecac. adhibendum.

Ex diuturna autem atonia, et causis immediate excitantibus ignotis, vomitu oriente, opiata aut interne aut externe, vel spiritus vini Gallici, adhibenda sunt; nonnunquam et vesicatorium ad regionem epigastricum applicandum.

Aciditas in primis viis, quum semper originem ab imperfecta concoctione ducat, vix removeri, nisi ventriculi atonia sublata, potest. Tentandum tamen quid ad ingesta attendendo perfici possit. Et inprimis evitanda sunt alimenta vegetabilia, quae fermentationis majoribus stadiis obnoxia sunt; dum contra cibus animalis, ut fermentationi acidae minus propensus adultis, et lac junioribus praebenda sunt. Urgente aciditate,

tate, sunt quoque alkalina abforbentiaque utenda. Horum solutio cum aëre fixo superfaturata saepe maximo cum emolumento usurpatur.

Quoad potum, observandum est, omnes liquores debiliores fermentatos evitandos esse, cerevisia iste (*porter* dicta) tamen haud male convenit; inter vina, eandem propter causam, sunt fortiora tenuioribus semper praeferenda, Madeirenseque omnibus fere aliis. Sunt autem qui omnem fermentationis gradum evitare, aut etiam arcere, varios liquores spirituosos aqua commiscent, et pro potu communi adhibent.

Alvi constipatio omnia dyspepsiae symptomata valde aggravat; est igitur sedulo removenda. Si vero fieri potest, sunt hoc consilio laxantia mitiora, potius quam purgantia, adhibenda. Ad hunc finem vix aliquid ex materia medica rhabbaro praestantius sit; dum enim vix purgat, amaritudinem ventriculo imprimis gratam et

D

quasi

quasi tonicam adfert. Si ad haemorrhoidas haud ulla aegro propensitas, et fortiolem desiderat intestinorum conditio catharticum, vidimus aloem valde prodesse. Olea, ut ricini, nauscam inducunt, ideoque sunt rejicienda.

Gastrodynia.—In ventriculi doloribus spasmotico, ut plerumque gastrodyniae oriuntur, aromata saepeque maxima stimulantia, ut ammonia, gummi foetidum, moschum, pernecessaria sunt. Horum tamen casibus gravissimis certe longe efficacius opium caute adhibendum est. Nam usu frequente intestinorum atoniam nunquam non auget.

Ad tertium nunc progredimur consilium, nempe, ventriculi tonum et vigorem quasi restituentia.

Tonicorum classis partim ex regno vegetabili, partim ex mineralibus, derivatur.

Inter vegetabilia, eminet cortex Peruvianus; sed in dyspepsia, quum in forma solida fermentationem promovet, in tinctura et aromaticis conjunctas, potius quam in pulveris forma, adhibendus est.

Ex quibus etiam perutilia alia amara, in his columbae et gentiani radices, chamaemeli flores, &c. Est tamen semper periculi aliquid ne his nimium utendis ventriculus talibus affuetus functiones solitas, his negatis, persolvi nequeat.

Inter atoniam ventriculi, et quidem totius corporis juvantia, variorum ex ferro praeparatorum virtutes nemo est qui non agnoscat. Sulphas hujus metalli etiamque zinci multi quoque laudant.

Cupri sulphas quoque in nonnullis atoniae,

ex nimio liquorum spirituosorum usu exemplis,
optimum edidit effectum.

Gratis antisepticis, leniterque stimulantibus,
utuntur quoque medici acidis fossilibus. In-
primis quidem ventriculo gratum est acidum
sulphuricum.

Inter tonica, sed quae totum corpus afficiunt,
sunt lavatio et exercitium numerandae; sed hoc
modicum tamen, et quibus adest animi dejectio
quo diversius solito, eo melius.

F I N I S.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

ROBERT A. FAY

CHICAGO, ILL.

1960

PHYSICS 309

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

ROBERT A. FAY

CHICAGO, ILL.

1960

PHYSICS 309

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

ROBERT A. FAY

CHICAGO, ILL.

1960

DISSERTATIO MEDICA

IN AUCURIA

DE

VARIOLA
